DESCRIPTIONS

DE CARABIQUES NOUVEAUX OU PEU CONNUS

PAR

M. J. Putzeys

Drypta sulcicollis, n. sp.

Pubescens, atro-cyanea, prothorace, capite, palpis, antennis pedibusque rufis, scapi femorumque apice nigris, tibiis tarsisque infuscatis. Caput punctatum vertice subpunctato transversim ruguloso. Prothorax subcylindricus, capite angustior, latitudine bis longior, ante medium ampliatus, ante basim constrictus, angulis posticis prominulis, obtusis; superficie grosse punctata, subplana, sulco medio lato, sulcis 2 marginalibus latis, irregularibus. Elytra elongata, subcylindrica, ultra medium paulo latiora, humeris deflexis, apice emarginato nec dentato; superficie parum convexa, profunde striata, striis grosse punctatis, interstitiis leviter punctulatis, 3.° punctis 3 ocellatis notato. Tarsi supra plurisulcati, unguiculi simplices.

Long. 10 $^1/_2$ — El. 6 — Lat. 3 $^1/_2$ mill.

Nouvelle Guinée (Andai) Août 1872. (Beccari et D'Albertis). 1 ind. ♂. Mus. Civique de Gênes.

Drypta fumigata, n. sp.

Pubescens, nigra, prothorace, capite, palpis, antennis tarsisque rufis; palporum maxillarium art.° penultimo, antennarumque scapo apice nigris. Caput totum punctatum. Prothorax subcylindricus, capite paulo angustior, latitudine bis longior, ad medium usque ampliatus, ante basim constrictus, angulis posticis prominulis obtusis, superficie grosse punctata, sulco

medio lato, margine utrinque depresso. Elytra elongata, post medium ampliata, apice emarginato nec dentato, profunde punctato-striata, interstitiis punctulatis, 3.° punctis 3 ocellatis notato. Tarsi supra haud sulcati, unguiculi simplices.

Nouv. Guinée (Andai) Août 1872. (Beccari et D'Albertis) 1 ♂. Mus. Civ. de Gênes.

Cette espèce diffère de la précédente par sa coloration, ses antennes un peu plus courtes, sa tête moins prolongée en arrière, entièrement et plus régulièrement ponctuée; son corselet plus court, plus élargi et plus arrondi sur les côtés, plus convexe et moins profondément sillonné; ses élytres moins longues, un peu plus convexes, moins échancrées à l'extrémité, ses intervalles plus fortement ponctuées; les tibias et les tarses garnis d'une pubescence plus épaisse, les tarses ne sont pas sillonnés en dessus.

MISCELUS, Klug Jahrb. I, 82.

Les caractères de ce genre ont été résumés d'une manière très complète par Lacordaire (Gen. des Col. I, p. 146) et par M. de Chaudoir (Ann. Soc. ent. Belg. XII, 152). Je n'ai donc point à y revenir.

Le type du genre a été décrit en 1834 par Klug sous le nom de *M. Javanus* et par Brullé sous celui de *Leptodactyla apicalis*. En 1845 j'ai fait connaitre une 2.e espèce (*M. unicolor*, Mém. Soc. Sciences de Liège II, 375). En 1862 M. de Chaudoir en a indiqué une 3.e de Ceylan (*M. ceylonicus*).

Je suis en mesure d'en décrire cinq nouvelles.

Les différences entre les espèces seront plus sensibles, si elles sont présentées d'une manière comparative.

Je commencerai donc par décrire complètement le *M. Javanus*.

I. Elytres portant au tiers inférieur une large tache rougeâtre qui s'étend de la suture au 4.e intervalle. Pattes rouges, cuisses noires au milieu; 1.er article des antennes d'un brun rouge, les autres testacés avec une ligne noire.

M. Javanus, Klug.

Long. 11 $^1/_2$ — El. 6 $^3/_4$ — Lat. 5 mill.

Tête ovale, assez renflée au delà des yeux, ce qui rend ceux-ci fort peu saillans. Labre très grand, déprimé au milieu de chaque côté; les côtés de sa base couverts de lignes transversales. Mandibules épaisses à la base, largement creusées sur la face externe, l'excavation ne dépassant pas le milieu du labre. Epistome échancré en arc, ses angles arrondis. Vertex parsemé de petits points, portant en avant une dépression en demi-cercle, un peu rugueuse, marquée de quelques très gros points. Le point pone-oculaire est situé en face du milieu des yeux. — Corselet cordiforme, peu élargi et surtout peu arrondi dans sa moitié supérieure où il n'est guère plus large que la tête avec les yeux; se rétrécissant ensuite et légèrement sinué au tiers inférieur; les angles de la base grands, coupés droit, un peu relevés à l'extrémité qui est obtuse; le bord antérieur est faiblement échancré; les angles sont un peu avancés et obtus; le rebord marginal est finement et régulièrement marqué, il ne s'élargit que vers les angles de la base laquelle est tronquée, non rebordée; la surface est couverte de rides transversales et parsemée de petits points; l'impression transversale postérieure est profonde de même que les fossettes basales qui sont triangulaires; l'impression transversale antérieure est bien marquée, anguleuse; le sillon central est large et profond; il atteint la base, mais non le bord antérieur. — Les élytres sont oblongues-allongées, fortement sinuées avant le milieu, tronquées obliquement à l'extrémité; les épaules sont largement arrondies; la surface est peu convexe; toutes les stries sont bien marquées dans toute leur étendue, ponctuées; les intervalles sont convexes, le 3.e, 5.e et 7.e sont un peu plus élevés; on y distingue quelques petits points épars, mais pas de points dorsaux; le 9.e porte, en dessous des épaules, 5 gros points ombiliqués, 2 autres au delà du milieu, puis il s'approfondit brusquement jusqu'à l'angle apical externe où l'on remarque encore un point en face de deux autres

placés sur la 8.e strie; le 3.e intervalle présente, à son extrémité, une sorte de tubercule; la strie préscutellaire est assez longue et parallèle à la suture.

Le dessous du corselet est lisse de même que les épisternes métathoraciques qui sont très allongés et très étroits dans leur moitié inférieure. L'abdomen est couvert, surtout au milieu, de petits points dont chacun donne naissance à un poil roux, court et couché. Les tibias antérieurs sont assez brusquement recourbés intérieurement, un peu plus bas que le milieu, non dilatés à l'extrémité qui est arrondie et ne porte intérieurement qu'une épine droite. Les tibias intermédiaires et postérieurs sont multi-sillonnés en dessus.

Java. Borneo (Sarawak) Doria et Beccari. Mus. Civ. de Gênes.

M. paradoxus, n. sp.

De mêmes dimensions et coloration que le *Javanus;* les antennes sont un peu plus grêles, d'un testacé plus clair. La dépression du vertex n'est pas marquée en avant, ses côtés sont plus rugueux et plus ponctués. Le corselet est beaucoup plus élargi et plus arrondi en avant, plus profondément sinué en arrière; les angles de la base sont plus saillans, plus droits, leur pointe restant obtuse; le sillon central est plus large et plus profond. Les élytres sont semblables, sauf que la marge fait une légère saillie au tiers postérieur.

I. Philippines.

M. convexicollis, n. sp.

Long. 10 $^1/_2$ — El. 6 — Lat. 3 $^1/_2$ mill.

Un peu plus petit que le *paradoxus:* le corselet a à peu près la même forme, mais il est un peu plus long et moins élargi en avant, quoique restant beaucoup plus cordiforme que chez le *Javanus;* les angles postérieurs sont plus droits et moins arrondis; sa surface est plus convexe; le sillon central est moins large; les yeux sont moins grands et un peu plus saillans.

Borneo (Sarawack) Doria et Beccari. Mus. Civ. de Gênes.

M. vulneratus, n. sp.

Long. 10 $^1/_2$ — El. 6 — Lat. 3 $^1/_2$ mill.

Plus petit que le *Javanus;* corselet pas plus large, mais plus long, se rétrécissant dès le premier tiers, moins sinué au dessus des angles postérieurs qui sont plus saillans et moins arrondis; le bord antérieur est plus échancré; les angles sont plus avancés. Les élytres sont semblables. La tête est beaucoup plus lisse; la dépression du vertex se rapproche de celle du *paradoxus.* La ponctuation et la villosité de l'abdomen sont beaucoup moins distinctes.

Moluques.

II. Elytres, palpes, pattes entièrement noirs; les derniers articles des antennes bruns.

M. unicolor, Putz. Prém. ent. p. 23.

Outre la coloration, la différence essentielle entre cette espèce et le *Javanus* consiste dans la forme du corselet qui est plus convexe, plus rétréci dès après le premier tiers où il atteint sa plus grande largeur; l'élévation des 3.e, 5.e et 7.e intervalles est aussi plus marquée.

Java.

M. luctuosus, n. sp.

Long. 14 $^1/_2$ — El. 9 — Lat. 5. mill.

Le corselet est beaucoup plus carré que dans toutes les autres espèces; fort peu arrondi et légèrement ondulé sur les côtés antérieurs jusqu'au delà du milieu, puis fortement sinué au dessus des angles postérieurs qui sont grands, relevés et très largement arrondis; la base, légèrement échancrée, est rebordée; le bord antérieur est faiblement échancré, bisinué, les angles sont peu saillans; le rebord marginal s'élargit beaucoup vers la base où, en face des angles, il porte quelques rides transversales; les foveoles du vertex sont larges et profondes; les yeux sont saillans: le point poneoculaire est situé en face de leur partie supérieure. Les ély-

tres sont allongées, échancrées à l'extrémité; les premières stries sont à peine ponctuées; les intervalles 3, 5 et 7 sont carénés à la base. La ponctuation et la pubescence de l'abdomen sont plus marquées que dans les autres espèces.

Nouvelle Guinée (Andai) Août 1872. (Beccari et D'Albertis). Mus. Civ. de Gênes.

M. stygicus, n. sp.

Long. 13 — El. 7 $^1/_2$ — Lat. 4 mill.

Plus grand que le *M. unicolor* dont il diffère par son corselet un peu plus long, moins élargi antérieurement, plus rétréci vers la base où les côtés sont moins sinués et les angles moins relevés; les stries ne sont pas distinctement ponctuées, sauf les 3 dernières; les intervalles sont plus égaux, le 7.e seul est caréné à sa base. L'extrémité des élytres n'est pas plus échancrée.

Même localité.

MORIO, Latr.

Pendant longtems, on n'a connu qu'un seul *Morio* des Indes orientales: le *M. orientalis*, décrit par Dejean, en 1825, sur un seul individu provenant de Java. En 1852 (Bull. Mosc. XXV, 81) M. De Chaudoir en a plutôt indiqué que décrit une 2.e espèce des Iles Philippines sous le nom de *Luzonicus:* c'est par la forme du corselet qu'elle diffère de l'*orientalis* « les » angles antérieurs ne sont point avancés ni saillans; les » côtés sont beaucoup moins sinués vers les angles postérieurs qui sont moins aigus; les intervalles des stries sur » les élytres sont plus plans ».

En 1858 (Ann. nat. hist. ser. 3, II, 203) Walker a donné les diagnoses de deux *Morio* de Ceylan *trogositoides* et *cucujoides;* elle se bornent à quelques caractères qui appartiennent à toutes les espèces du genre et ne se distinguent l'une de l'autre qu'en ce que, dans la seconde, le dessus est plus brillant et que les pattes sont rougeâtres, ce qui, on le sait,

est un accident fréquent dans ce groupe. On ne peut évidemment tenir aucun compte de ces prétendues diagnoses.

En 1873 (Ann. Mus. Civ. di Genova, IV, 216), j'ai signalé les caractéres d'une espèce (*M. Walkeri*) provenant des montagnes centrales de Ceylan; assez voisine, au surplus de l'*orientalis* et j'en ai décrit deux autres de Borneo, toutes les deux bien distinctes, l'une (*brevior*) par la brièveté de ses élytres, l'autre (*Doriae*) par la forme particulière de son corselet et par la ponctuation des stries.

L'exploration de la Nouvelle Guinée par M.rs Beccari et D'Albertis a fait découvrir un nouveau *Morio* que je vais décrire.

M. longipennis, n. sp.

Long. 19 à 12 — El. 11 à 7 $^1/_2$ — Lat. 5 $^1/_2$ à 3 $^1/_3$ mill.

De la couleur noire et brillante du *M. orientalis;* parfois les cuisses sont plus ou moins brunes. Il est sensiblement plus étroit dans toutes ses proportions que l'*orientalis;* la tête est semblable, mais les orbites dans lesquels les yeux sont enfoncés sont moins arrondis en arrière; le corselet est plus étroit, surtout en avant, où les côtés sont moins arqués; ils se redressent beaucoup plus au dessus des angles postérieurs qui sont plus grands, moins relevés et moins épais; les deux fossettes basales sont situées plus loin du bord externe; la base même est plus tronquée. Les élytres sont plus allongées, leurs côtés sont plus parallèles; l'extrémité est plus sinuée, les épaules sont moins relevées; les stries sont semblables, mais les 3 premières sont plus profondes.

Nouvelle Guinée (Andai, Hatam, Sorong) Beccari et D'Albertis. — Is. Arou, Beccari. Mus. Civ. de Gênes.

PERIGONA, Castelnau.

(Voy. Ann. Mus. Gen. IV [1873] 218).

1. **P. nigrifrons**, Motsch.

V. Ann. Mus. Gen., l. c., p. 220.

Ceylan.

2. **P. ruficollis**, Motsch.
V. Ann. Mus. Gen., l. c., p. 222.
Borneo.

3. **P. nigricollis**, Motsch.
V. Ann. Mus. Gen., l. c., p. 222.
Borneo.

4. **P. suturalis**, n. sp.

Nitida, nigra, prothorace obscure rufescente, palpis, antennis, labro, epistomate, elytrorum interstitio suturali pedibusque testaceis.

Prothorax transversus, lateribus arcuatis, postice angustatis, angulis anticis vix prominulis, posticis vero subrotundatis. Elytra oblongo-ovata, laevia, striis prima ultimaque tantum conspicuis; humeris rotundatis.

Long. 4 — El. 2 $^3/_4$ — Lat. 1 $^1/_2$ mill.

Comparée à la *P. nigricollis*, elle a le corselet plus convexe, plus arrondi sur les côtés, plus rétréci vers la base dont les angles sont très obtus, presqu'arrondis; les angles antérieurs sont encore moins saillans; le sillon longitudinal ne dépasse pas l'impression transversale postérieure; les élytres sont plus allongées, les épaules plus arrondies; la suture seule et le 1.er intervalles sont testacés dans toute leur étendue; on ne distingue que de faibles traces des premières stries; le 3.e intervalle porte 3 points plus gros que chez la *nigricollis*.

Nouvelle Guinée (Sorong) Beccari et D'Albertis. 1 ind. Mus. Civ. de Gênes.

5. **P. luzonica**, n. sp.

Piceà, nitida, ore, antennis, pedibus suturaque testaceis. Prothorax transversim subquadratus, postice angustatus, angulis posticis obtusis. Elytra elongato-oblonga, striis 3 internis abbreviatis, parum profundis, interstitio 3.° tripunctato.

Long. 5 — El. 3 — Lat. 1 $^1/_2$ mill.

Un peu plus petite et plus allongée que la *nigrifrons*. Le labre est échancré. La partie antérieure de la tête ne porte

pas d'autre sillon transversal que la suture de l'épistôme; toute la surface est finement aciculée. Le vertex, un peu aplani, n'est pas fovéolé. Les yeux sont saillans; leur orbite postérieur est petit; le point pone-oculaire antérieur est bien distinct, mais situé contre l'oeil. Le corselet est trapézoidal, rétréci en arrière, légèrement arrondi au premier tiers, puis descendant obliquement jusqu'aux angles de la base qui sont très obtus et nullement relevés; le bord antérieur est tronqué; ses angles sont droits avec la pointe obtuse; la base n'est pas échancrée; à partir des deux fossettes basales, linéaires et profondes, elle se relève jusqu'aux angles. Le rebord marginal est finement marqué, un peu élargi en avant et en arrière; il se prolonge jusqu'aux fossettes basales; le sillon longitudinal est profond; il ne dépasse pas les impressions transversales. Les élytres sont un peu plus larges que la partie antérieure du corselet, subcylindriques avec les épaules relevées et très arrondies, légèrement sinuées avant l'extrémité. Les 3 premières stries sont larges, mais peu profondes, peu distinctement ponctuées; la 4.e est encore visible; toutes disparaissent un peu au delà du milieu; la 3.e porte un point pilifère au tiers antérieur; la 2.e en porte un 2.e un peu plus bas que le milieu et un 3.e à l'extrémité. Toute la surface est parsemée d'une ponctuation très fine. D'un brun de poix brillant; les palpes, le labre, les antennes et les pattes sont testacés; la suture jusque vers le milieu est également testacée, mais un peu plus rougeâtre. On remarque aussi une fine bordure testacée à l'extrémité des élytres et au milieu des bords antérieur et postérieur du corselet. Le dessous du corps est rougeâtre.

Manille, 1 ind.

6. **P. convexicollis**, n. sp.

Long. 4 3/4 — El. 3 1/2 — Lat. 2 3/4 mill.

De même que les *P. Beccarii*, *plagiata* et *basalis*, cette espèce se distingue par son corselet plus convexe, plus rétréci vers la base, à angles moins marqués.

D'un testacé un peu obscur, moins rougeâtre que chez la *nigricollis*. Tête noire, de même que les élytres sauf, pour celles-ci, une bande longitudinale qui occupe la suture et les deux premiers intervalles. Les mandibules sont obscures.

Le labre n'est que faiblement échancré; les sillons entre les antennes sont beaucoup moins marqués que dans la plupart des autres espèces. Les yeux sont peu saillans, à peu près comme chez la *ruficollis*. Le corselet, quoique plus large que la tête, est plus étroit; plus rétréci en arrière que chez la *nigricollis;* ses côtés ne sont nullement sinués et les angles postérieurs sont à peine distincts; les angles antérieurs sont moins avancés et le rebord marginal est moins élevé; le deux fossettes basales sont plus superficielles, le sillon longitudinal est moins profond à ses deux extrémités; les élytres sont plus larges, plus courtes, les épaules sont moins relevées et plus arrondies; la surface est tout aussi peu distinctement striée et les deux points dorsaux sont placés de même.

C'est de la *Luzonica* qu'elle se rapproche le plus: elle en diffère par la coloration et en ce que les élytres sont plus courtes, l'extrémité suturale est plus arrondie de même que les épaules; les stries sont moins distinctes; le corselet est plus étroit, plus convexe; les yeux sont moins saillans; les sillons frontaux moins distincts et le labre moins échancré.

Inde (Djohore), 1 ind.

7. **P. pallida**, Casteln.

V. Ann. Mus. Gen., l. c., p. 224.

8. **P. livens**, Putz.

V. Ann. Mus. Gen., l. c., p. 225.

9. **P. subcordata**, n. sp.

Nigra, ore, palpis, antennis, labro, epistomate pedibusque testaceis, elytrorum sutura abdomineque rufis; labro emarginato; prothorace subcordato angulis posticis rotundatis; elytris oblongis,

striis 5 primis latis neque profundis, punctatis, interstitiis obsolete punctulatis, 3.° tripunctato.

Long. 5 $^1/_2$ — El. 3 $^1/_4$ — Lat. 2 mill.

D'un noir brillant; parties de la bouche, palpes, antennes, labre, épistome et pattes testacés; suture et abdomen rougeâtres.

Labre profondément échancré. Tête très finement granuleuse, obliquement impressionnée entre les antennes: yeux médiocrement saillans, enchâssés en arrière. Corselet beaucoup plus large que la tête, brièvement cordiforme, arrondi sur les côtés, mais surtout en avant où les angles sont obtus et légèrement saillans; les angles postérieurs, quoique distincts, sont arrondis. La base est un peu échancrée au milieu et ses côtés, déprimés en face des fossettes basales, se relèvent vers les angles; la surface est peu convexe, granuleuse comme la tête et parsemée de quelques points très petits. Le sillon longitudinal est profond, mais il ne dépasse pas les impressions transversales dont l'inférieure est bien marquée et assez rapprochée de la base; les fossettes latérales sont larges, linéaires au fond, légèrement rugueuses. — Les élytres sont oblongues, très arrondies aux épaules et subtronquées obliquement à l'extrémité, assez planes; on n'y distingue que les cinq premières stries qui n'atteignent pas tout-à-fait la base et qui disparaissent dès le tiers postérieur; on ne voit que de faibles traces des deux suivantes; ces stries sont larges, ponctuées, mais peu profondes; la strie préscutellaire, ayant 3 fois la longueur de l'écusson, n'est indiquée que par des points alignés: les intervalles sont finement ponctués; le 3.e est tri-ponctué: l'avant dernière strie est disposée comme dans les autres espèces du genre.

En dessous, l'insecte n'est pas ponctué; les segmens abdominaux, bruns, sont bordés d'un testacé clair. Les appendices membraneux font saillie dans une échancrure de chaque côté du dernier segment; à l'extrémité, on remarque deux points ombiliqués écartés (♂); le milieu est légèrement échancré.

Is. Key (Beccari), 2 ind. — Mus. Civ. de Gênes.

10. P. subcyanescens, n. sp.

Nigro-cyanescens, ore, palpis, antennis, labro, epistomate pedibusque testaceis, sutura rufescente; labro subemarginato; prothorace breviter subquadrato, angulis posticis obtusis; elytris oblongo-ovatis, humeris subrotundatis; striis 4 primis distinctis, antice posticeque abbreviatis, latis, parum profundis, obscure punctulatis, interstitiis punctulatis, 3.º tripunctato.

Long. 4 — El. 2 $^1/_2$ — Lat. 1 $^1/_2$ mill.

D'un noir bleuâtre; plus petite que la *P. subcordata*, plus large dans toutes ses proportions; élytres plus courtes; yeux un peu plus convexes; corselet plus court et plus large, moins rétréci en arrière; les côtés de la base remontent plus obliquement vers les angles qui sont plus marqués; les fossettes basales sont simplement linéaires, situées à égale distance du sillon longitudinal et du bord latéral, tandis que dans la *P. subcordata*, elles sont arrondies, profondes, et situées contre les angles: l'impression transversale inférieure est plus profonde et un peu rugueuse en dessous. Les élytres sont un peu plus courtes et plus larges; le sillon basal est moins oblique; l'angle huméral est moins arrondi; les 4 premières stries seules sont distinctes, mais moins profondes; les intervalles sont également parsemés de points très petits; l'abdomen est finement pubescent, ponctué et granuleux; chez le ♂, il porte 2 points écartés.

Nouvelle Guinée (Andai, près Dorey). Beccari et D'Albertis. 2 ind. — Mus. Civ. de Gênes.

11. P. Beccarii, n. sp.

Cette espèce et les deux suivantes diffèrent un peu des autres par leur coloration testacée plus claire et beaucoup moins rougeâtre, par leur corselet plus convexe et moins droit sur les côtés.

Les parties de la bouche, le labre, l'épistome, les antennes et les pattes sont testacés, de même que les élytres, sauf une large tache dorsale qui ne dépasse pas le quart postérieur, et une tache apicale; le corselet est d'un testacé plus rouge. Toute la tête est couverte d'une granulation très fine, très serrée et très régulière. Le labre est

simplement tronqué. Les deux impressions latérales de la tête sont profondes et s'étendent jusqu'au point pone-oculaire antérieur. Le vertex porte une fossette ovale. Les yeux sont saillans, non enchâssés en arrière. Le corselet est convexe, un peu plus large que la tête avec les yeux, presque carré, d'un quart plus large que long, un peu rétréci dans ses deux tiers postérieurs, arrondi sur les côtés antérieurs, puis coupé obliquement jusqu'aux angles de la base qui sont très arrondis et légèrement relevés; le bord antérieur est tronqué, mais vu du dessus, il parait un peu avancé aux angles qui sont obtus. La base est également tronquée au milieu. Le rebord marginal, finement teinté de noir, s'étend jusqu'en dessous des angles de la base. La surface est glabre, finement rugueuse le long de la base et surtout vers les angles: les deux impressions transversales sont bien marquées; le sillon longitudinal ne les dépasse point. Les deux fossettes basales sont à peine distinctes. — Les élytres sont d'un quart plus larges que le corselet, ovales-oblongues, un peu élargies en arrière; la base est tronquée; le sillon basal ne dépasse pas la 3.e strie: il commence dans une fossette ronde, se relève légèrement vers les épaules qui sont arrondies. La gouttière marginale va en s'élargissant jusqu'à la courbure qui précède l'extrémité et de là elle se rétrécit jusqu'à la suture. L'extrémité suturale de chaque élytre est arrondie. La surface est un peu aplanie au milieu, convexe sur les côtés. La 1.re strie seule se prolonge distinctement jusqu'à l'extrémité; les trois suivantes sont larges mais très peu profondes et ne sont un peu distinctes que vers le milieu; la 8.e est bien marquée un peu avant l'extrémité, elle s'écarte de la marge et se prolonge obliquement jusque près de la suture: les intervalles sont extrêmement finement et vaguement ponctués; le 3.e porte trois gros points peu profonds. — Le dessous du corps est finement ponctué; l'abdomen porte de nombreux points pilifères très distincts. La pointe sternale très rétrécie entre les hanches, s'élargit à son extrémité.

Borneo (Sarawak), Doria et Beccari. — Mus. Civ. de Gênes.

12. **P. plagiata**, n. sp.

Long. 2 $^1/_2$ — El. 1 $^1/_2$ — Lat. 1 $^1/_8$ mill.

Diffère de la *P. Beccarii* par sa taille constamment plus petite, ses élytres plus courtes, son corselet plus élargi et plus arrondi en avant et dont les angles postérieurs sont plus marqués; les fossettes basales sont plus distinctes. Le labre est légèrement échancré; les sillons entre les antennes sont moins larges et plus obliques. La coloration des élytres est différente; la base est testacée de même que la suture et l'espace occupé par les premières stries; chez la *Beccarii* les taches noires sont interrompues avant l'extrémité par un espace testacé sémicirculaire. Le dessous des deux insectes n'offre pas de différence.

Is. Arou et Is. Key (Beccari). Nouv. Guinée (Andai) (Beccari et D'Albertis). — Mus. Civ. de Gênes.

13. **P. minor**, n. sp.

Long. 1 $^1/_2$ — El. 1 — Lat. $^2/_3$ mill.

Testacée, corselet rougeâtre de même que la base des élytres (parfois cependant la base est noire): tête et élytres d'un noir de poix.

Beaucoup plus petite que la *P. Beccarii;* corselet plus court et plus étroit, plus rétréci en arrière; angles antérieurs moins arrondis, angles postérieurs plus marqués et plus relevés; yeux moins saillans; élytres un peu plus allongées; épaules plus anguleuses, suture plus relevée; les stries internes sont un peu distinctes; les impressions entre les antennes sont plus courtes et plus profondes; les yeux sont beaucoup moins saillans.

Borneo (Sarawak), Doria et Beccari. — Mus. Civ. de Gênes.

14. **P. basalis**, Putz.

V. Ann. Mus. Gen., l c., p. 223.

Australia.

15. **P. fimicola**, Woll. (*Trechus*) Ins. Mad. p. 63 (*Trechicus*). Ann. Mag. nat. hist. 1862, p. 288 et Col. Atlant. n.° 149.

P. Jansonianus, Woll. (*Trechus*). Ann. Mag. nat. hist. 1858, p. 19.

Madère.

Cette espèce et la suivante ont les 4 premiers articles des antennes, plus étroits et un peu plus longs; leur labre est plus allongé et plus rétréci en avant.

16. **P. Japonica**, Bates (*Trechicus*) Japon. Geod. p. 281.

Japon (Nagasaki). Je l'ai reçue de M.r Lewis.

Elle diffère surtout de la précédente par son corselet plus convexe.

Il me reste à mentionner deux espèces de Madagascar, que je ne connais pas.

P. Coquereli, Fairm., Ann. S. ent. Fr. 1869, 766.

P. suturella, Fairm., ib.

Euchroa obscura, n. sp.

Violaceo-nigra, palpis basi apiceque testaceis.

Prothorax transversim subquadratus antice angustatus, in margine postico haud sinuatus, angulis baseos fere rectis subobtusis. Elytra oblonga, interstitio 3.° tripunctato; abdominis segmento ultimo apice in ♂ bi-in ♀ 4-punctato.

Long. 10 — *El.* 5 $^1/_2$ — *Lat.* 3 $^1/_2$ *mill.*

D'un noir violacé ayant parfois un reflet bronzé. La dent du menton est large, un peu échancrée. La tête est très finement ponctuée, fovéolée au centre; elle porte de chaque côté un sillon arqué s'étendant du milieu de l'épistome jusque près du 1.er point pone-oculaire. Les yeux sont grands et saillans. Le corselet est presque carré, un peu plus large que long, légèrement rétréci en avant: les côtés ne sont pas sinués avant les angles postérieurs qui sont presque droits avec la pointe un peu obtuse; le bord antérieur n'est point échancré; la base est bisinuée, non rebordée au milieu; le rebord marginal est fin et régulier; les fossettes basales sont

profondes, lisses, un peu obliques, prolongées jusqu'au delà du tiers du corselet; les deux impressions transversales, antérieure et postérieure, ne sont distinctes qu'au milieu. — Les élytres sont oblongues, n'ayant aux épaules que la largeur de la base du corselet, s'élargissant ensuite; faiblement sinuées à l'extrémité; les stries sont simples et profondes, les intervalles un peu convexes; le 3.e porte trois gros points: le 1.er contre la 3.e strie, les 2 autres contre la 2.e. Les gros points du 8.e intervalle sont très espacés au milieu. La strie préscutellaire est courte, oblique et part d'un point ombiliqué contre la 2.e strie. La pointe sternale est rebordée. Le dessous du corselet est lisse; les épisternes métathoraciques sont allongés. Le dernier segment abdominal est déprimé à son extrémité et porte, de chaque côté, un gros point pilifère chez le ♂, 2 chez la ♀. Dans la plupart des autres espèces ces points sont situés vers le milieu du segment.

Montevideo (Sivori et Arechavaleta). — Mus. Civ. de Gênes et Putzeys.

Agonum inaequale, n. sp.

Piceum, parum nitidum, in elytris brunneum; palpis antennis, pedibus, prothoracis elytrorumque margine testaceis, femoribus palporumque articulis ultimis obscuris. Epistoma utrinque fossulatum. Vertex utrinque sulcatus et juxta oculos plurisulcatus. Caput post oculos attenuatum. Prothorax subquadratus, angulis rotundatis, margine ante medium subangulato, ad basim mediam usque reflexo, supra aciculato. Elytra oblonga, humeris rotundatis, apice producto, vix sinuato, margine tenui in medio latiore; striae omnes integrae, 2.a tantum ante apicem 2.ae conjuncta, simplices; interstitiis latitudine inaequalibus, 1.o atque 5.o caeteris duplo latioribus punctisque majoribus duplici serie notatis; serie marginali in medio subinterrupta; striola praescutellari scutello triplo longiore.

Long. 7 — El. 4 $^1/_2$ — Lat. 3 mill.

Montevideo (Sivori). — Mus. Civ. de Gênes.

Platymetopus cavernosus, n. sp.

Nigro-aeneus, palpis, antennis, labro pedibusque piceis. Caput convexiusculum, lateribus vage punctulatum. Prothorax breviter subcordatus, antice posticeque leviter emarginatus, angulis posticis obtusis, superficie in medio minus, basi magis punctata. Elytra oblonga, humeris elevatis, apice profunde emarginata, in dorso subplanata, simpliciter striata, interstitiis planis, punctulatis, 3.°, 5.° atque 7.° multifoveolatis, 5.° tamen parcius, 2.° caeteris angustiore: striola praescutellaris brevis.

Long. 8 — El. 5 $^3/_4$ — Lat. 3 mill.

Macassar (Beccari). — Mus. civ. de Gênes.

G. TACHYS.

Les *Tachys* des Indes orientales sont fort nombreux. Beaucoup ont déjà été plus ou moins décrits par Motschulsky (*acaroides, impressipennis, flaviculus, cinctipennis, politus, sericeus, umbrosus, parallelus, impressus, dorsalis, suturalis, ovatus, fumicatus, tenellus*), Nietner (*tropicus, triangularis, ceylonicus, ebeninus, orientalis, emarginatus, ornatus, scydmaenoides, Klugi*), Walker (*rufulus, finitimus*), Schaum (*fusculus, geminatus, quadrillum, Nietneri*). M.r Bates s'est occupé des espèces du Japon et du Nord de la Chine (*exaratus, pallescens, sericans, laetificus, fuscicauda, perlutus, microscopicus, gradatus, poecilopterus, vixstriatus*).

Je vais à mon tour en décrire quelques espèces des mêmes régions, que je n'ai pas reconnues dans les descriptions déjà publiées.

J'ai cru devoir comprendre dans le tableau qui va suivre celles dont Motschulsky m'a remis des types et dont j'ai pu ainsi compléter les caractères.

I. Elytra brevia, convexa.

(Stria 8.a integra, profunda).

A. Sulci frontales longi.

a) postice divergentes et oculos amplectentes . . *coracinus*, P.

b) postice divergentes, antice paralleli . . . . . *subfasciatus*, P.

c) antice conniventes (duplicati).

1. usque ad apicem epistomatis.
— labrum emarginatum . . . . . *emarginatus*, M.
= labrum haud emarginatum . . . . . *geminatus*, Sch.
2. usque ad basim epistomatis.
+ Elytra basi angulata. . . . . *sulcatus*, M.
++ Elytra basi haud angulata.
φ oculi prominuli . . . . . *acuticollis*, P.
φφ oculi subplanati . . . . . *acaroides*, M.
B. Sulci frontales breves, oculorum basim non aequantes.
+ Labrum amplum, rotundatum . . . . . *unistriatus*, P.
++ Labrum breve, truncatum.
a. Sulci frontales duplicati.
ǂ Elytra basi rotundata.
× interstitiis punctulatis . . . . . *interpunctatus*, P.
×× interstitiis haud punctulatis.
* Striis dorsalibus 2.
— Elytra nigra . . . . . *fusculus*, Sch.
= Elytra 4-maculata. . . . . *ornatus*, N.
** Striis dorsalibus 3 . . . . . *anceps*, P.
ǂǂ Elytra basi angulata.
√ Striis omnibus profundis.
′ Elytra unicoloria . . . . . *sulcatopunctatus*, P.
″ Elytra maculata. . . . . *sulculatus*, P.
√√ Striis dorsalibus 2.
‹ Prothorax lateribus magis rotundatis . . . . . *politus*, M.
« Prothorax lateribus minus rotundatis. . . . . *bioculatus*, P.
b. Sulci frontales simplices.
⊛ Striis dorsalibus 2, 2.ª arcuata. . . . . *arcuatus*, P.
⊛⊛ Striis dorsalibus 5 . . . . . *aeneus*, P.

II. Elytra ovato-oblonga.

Elytra deplanata . . . . . *umbrosus*, M.
Elytra subconvexa.
Prothorax transversus latus . . . . . *plagiatus*, P.
Prothorax angustior . . . . . *pictipennis*, P.

III. Elytra oblonga.

+ Oculi subplanati . . . . . *impressipennis*, M.
++ Oculi convexi.
× Elytra stria 8.ª profunda, integra . . . . . *flaviculus*, M.
×× Elytra stria 8.ª profunda, non integra.
φ Elytra basi angulata . . . . . *suturalis*, M.
φφ Elytra basi rotundata.
› Stria 2.ª apice profunda.
a) Striis 6 primis perspicuis . . . *tropicus*, Nietn.
b) Striis 6 primis vix perspicuis. . *cinctus*, P.
» Stria 2.ª apice deleta.
Elytris parallelis . . . . . *cruciger*, P.
Elytris haud parallelis. . . . . *ephippiatus*, P.

T. coracinus, n. sp.

Niger, nitidus; palpis, antennis tibiisque testaceis, femoribus brunneis. Antennae breves, ab articulo 4.° crassiusculae et submoniliformes. Sulci frontales longi, antice fere paralleli, postice oculos amplectentes. Prothorax transversim quadratus, antice rotundatus, ante basim sinuatus, angulis posticis rectis supra carinatis, sulco basali arcuato, profundo, laevi. Elytra ovata, apice angustata, basi rotundata, stria 8.ª integra, profunda: striis dorsalibus 2 obsoletis latis, suturali apice retrorsum versus marginem recurva, ibique sinuata, apice arcuato.

Long. 1 $^3/_4$ — El. 1 $^1/_4$ — Lat. $^3/_4$ mill.

Borneo (Sarawak) Doria et Beccari. Mus. Civ. de Gênes.

T. subfasciatus, n. sp.

Rufo-testaceus, elytris in medio fascia obscura ornatis, apice pallide testaceis; palpis, antennis basi pedibusque testaceis. Antennae longae, apicem versus subincrassatae. Sulci frontales parum profundi, sat elongati, oculorum basim tamen vix attingentes, postice divergentes. Oculi parum prominuli. Prothorax brevis, transversim quadratus, antice rotundatus, postice haud angustatus, angulis baseos rectis, planatis. Elytra lata, postice angustata, convexa, basi truncata, in medio haud angulata, humeris obtusis; striis 1.ª et 8.ª integris, profundis, 2.ª parum et in prima parte tantum conspicua.

Long. 2 — El. 1 $^1/_3$ — Lat. 1 mill.

La partie postérieure des élytres offre l'apparence de deux taches pâles, arrondies.

Celebes.

T. emarginatus, Nietn. Ann. nat. hist. 1858, 425, 77.

Brunneus, maculis 4 rubris, labro profunde emarginato, striis dorsalibus 2 profundis. Sulcis frontalibus oculorum basim aequantibus. (1 $^1/_4$ mill.).

Ceylan.

T. geminatus, Sch. Berl. E. Z. 1860, 200.
Celebes.

T. sulcatus, Motsch. Bull. Mosc. 1851, 508, n. 150.
Niger, maculis 2 rubris, striis dorsalibus 6 profundis. (2 mill.).
Ind. or.

T. acuticollis, n. sp.
Niger, nitidus, palpis, antennarum art.is 4 primis tibiisque testaceis, femoribus brunneis, elytrorum maculis 2 albidis transversim oblongis, 1.a subhumerali, 2.a ante-apicali; sulci frontales postice divergentes, antice ad epistomatis suturam profundam subconvergentes. Prothorax transversim subquadratus, basi angustior, antice rotundatus, basi utrinque obliqua, angulis acutis, margine laterali lato, foveolis basalibus profundis. Elytra breviter ovata, postice angustata, antice truncata, basi rotundata, stria 8.a profunda, striis dorsalibus nullis, suturali tantum in parte postica conspicua, apice versus marginem recurva.
Long. 1 $^1/_2$ — El. 1 — Lat. $^3/_4$ mill.
I. Arou (Wokan) Beccari. Mus. Civ. de Gênes.

T. acaroides, Motsch. Et. ent. 1859, 39.
Testaceus, apice brunneus, prothorax transversus, angulis subrotundatis, subtus emarginatis, stria dorsali una. (1 mill.).
Ceylan (Colombo).

T. unistriatus, n. sp.
Rufo-testaceus, elytris infra medium plaga triangulari fusca, maculisque 2 ante-apicalibus pallidis; antennae articulis 9 ultimis brunneis. Labrum majus, antice rotundatum. Antennae art.is 6 ultimis crassioribus. Oculi parum prominuli, sulci frontales angusti, breves, postice divergentes. Prothorax transversim quadratus, antice rotundatus, lateribus infra medium fere rectis, basi truncata, angulis rectis; impressione transversa postica brevis, punctulata. Elytra breviter ovata, con-

vexa, basi rotundata; stria 8.ª integra, striola apicali recurva media; stria suturali tantum perspicua.

Long. 2 — El. 1 $^1/_2$ — Lat. 1 mill.

Reçu de feu A. Deyrolle comme venant des I. Celebes. (Wallace).

T. interpunctatus, n. sp.

Niger, subaeneo-micans, elytris maculis 2 rubris anteapicalibus ornatis; palpis, antennis pedibusque testaceis, antennarum articulis 2-5 obscuris. Antennae art.^{is} elongatis; foveolae frontales breves, profundae. Prothorax cordatus, antice maxime rotundatus ibique latius marginatus, infra medium angustatus, dein sinuatus, angulis posticis acutis prominulis, carinatis; impressione transversa postica basi parallela, profunda, foveolata, sulco longitudinali basi apiceque profundiore. Elytra breviter ovata, prothorace duplo latiora, convexa, basi rotundata, stria 8.ª integra, striis dorsalibus 3, suturali tantum integra, caeteris basi apiceque abbreviatis, striola apicali recurva brevi, media; superficie punctis distantibus impressis, in interstitiis lineatim dispositis.

Long. 2 $^2/_3$ — El. 1 $^1/_2$ — Lat. 1 $^1/_3$ mill.

J'ai reçu jadis cet insecte de feu A. Deyrolle, comme faisant partie de ceux rapportés des I. Celebes par Wallace.

T. fusculus, Sch. Berl. E. Z. 1860, 200.

Sulci frontales duplicati, breves, parum profundi; prothorax breviter subcordatus, antice rotundatus, angulis posticis minutis, prominentibus, supra carinatis. Elytra basi rotundata, stria 8.ª integra, 2.ª utrinque abbreviata, striae 1.^{ae} parte recurva arcuata.

Hong Kong.

T. ornatus, Nietn. l. c. p. 426, 76.

Brunneus, palpis, antennarum basi pedibusque testaceis, elytrorum maculis 4 flavis plus minusve distinctis; sulci frontales duplicati, breves, paralleli. Prothorax angustus, qua-

dratus, lateribus usque ad angulos posticos rotundatus, his acute subrectis, supra carinatis, basi extus arcuata, impressione transversali basali profunda, ad sulcum longitudinalem bifoveolata. Elytra oblongo-ovata, basi rotundata, apice haud angustata, stria 1.ª 8aque integris, 2.ª utrinque abbreviata, caeteris nullis.

Ceylan.

T. anceps, n. sp.

Rufus, palpis, antennis, pedibus elytrorumque apice testaceis. Antennae crassiusculae. Labrum rotundatum, sulci frontales postice subdivergentes. Prothorax subcordatus, antice rotundatus, ultra medium angustatus, ante angulos rectos leviter sinuatus, basi truncata, impressione transversali postica profunda, 3 foveolata, sulco longitudinali profundo. Elytra prothorace fere duplo latiora, oblongo-ovata, supra subdeplanata, basi rotundata; stria 8.ª integra, striis dorsalibus 3, 2.ª atque 3.ª utrinque abbreviatis; striola apicali recurva in medio sita, apice hamata.

Long. 1 $^1/_2$ — El. 1 — Lat. $^3/_4$ mill.

Ind. or.

T. sulcatopunctatus, n. sp.

Nigro-aeneus, palpis basi, antennarum art.is 3 primis pedibusque testaceis. Sulci frontales breves, duplicati, paralleli. Prothorax convexus, breviter subcordatus, lateribus rotundatis, ante basim angustatus, sinuatus, angulis acute rectis, prominulis, supra carinatis, antice basique truncatus; impressione transversa basali profunda, seriepunctata, sulco longitudinali leviter impresso. Elytra prothorace sesqui latiora, basi truncata, in medio angulata, apice angustata, striis omnibus profundis punctatisque, suturali atque 8.ª integris, 1.ª apice breviter in medio reflexa, caeteris basi apiceque abbreviatis, 5.ª basi longiore.

Long. 3 — El. 2 — Lat. 1 $^1/_2$ mill.

Celebes.

T. sulculatus, n. sp.

Atro-aeneus, cyaneo-micans, palpis basi, antennarum art.is 4 primis, elytrorum maculis 2 posticis pedibusque pallide testaceis, femoribus fuscis. Sulci frontales breves, duplicati, paralleli. Prothorax latus, transversus, basi latior, lateribus anticis rotundatus, ante basim sinuatus, angulis posticis acute rectis, prominulis, supra carinula longiore instructis, antice basique truncatus, impressione transversa basali profunda, seriepunctata, utrinque bifoveolata, sulco longitudinali profundo. Elytra prothorace latiora, postice paulo angustata, basi in medio angulata; striis profundis latisque grosse punctatis, omnibus distinctis, sed, praeter 1.am atque 8.am, basi apiceque abbreviatis.

Long. 2 1/2 — El. 1 1/2 — Lat. 1 1/4 mill.

Hong Kong.

Diffère du *Sulcatopunctatus* par sa taille plus grande, son corselet beaucoup plus large, nullement rétréci vers la base, ses élytres beaucoup moins étroites à l'extrémité et dont chacune porte au milieu du quart postérieur une petite tache testacée de forme arrondie. Les cuisses sont obscures au milieu.

T. politus. Motsch.

Piceo niger, maculis 2 rubris, striis dorsalibus 2 profundis. (2 1/2 mill.).

Ind. or.

T. bioculatus, n. sp.

Nigro-aeneus, palpis, antennarum art.o 1.o (2.o et 3.o obscurioribus) pedibusque testaceis; elytrorum macula ante-apicali in utroque rufa. Sulci frontales duplicati, breves, paralleli. Prothorax transversim cordatus, lateribus rotundatus, post medium angustatus, ante basim sinuatus. angulis posticis parvis, acutiusculis, prominulis, supra carinatis, impressione basali transversa serie-punctata. Elytra breviter ovata, apice leviter angustata, basi in medio angulata; stria 1.a et 8.a in-

tegris, profundis, 2.ª utrinque abbreviata, 3.ª minus perspicua.

Long. 2 3/4 — El. 1 3/4 — Lat. 1 1/4 mill.

Ceylan.

A *polito* praecipue differt prothorace lateribus anticis magis dilatatis atque rotundatis, basi paulo angustiore.

T. arcuatus, n. sp.

Niger nitidus, palpis, antennis basi pedibusque testaceis, elytrorum maculis 2 rotundatis rufis, 1.ª subhumerali, 2.ª anteapicali. Labrum subtruncatum. Antennae ultra humeros porrectae, setaceae, art.° 2.° minore, 3 primis testaceis. Sulci frontales breves, paralleli, foveam oblongam efformantes, oculi prominuli. Prothorax subcordatus, elongatus, angustus, lateribus rotundatus sed parum dilatatus, ante basim sinuatus, angulis posticis acute rectis, supra carinatis; basi anticeque truncatus, lateribus anguste marginatus, impressione transversali 5-foveolata. — Elytra prothorace duplo latiora, breviter ovata, apice angustata, convexa; stria 8.ª integra, stria marginali ultra humerum rotundata; striis dorsalibus 2, 1.ª integra apice breviter recurva, 2.ª utrinque abbreviata, suturali haud parallela sed in medio recedente.

Long. 3 1/4 — El. 2 — Lat. 1/2 mill.

Ceylan. — Coll. Dohrn.

T. aeneus, n. sp.

Aeneus, palpis, antennarum art.° 1.° pedibusque testaceis, palporum art.° ultimo antennisque fuscis.

Antennae longae, graciles; foveolae frontales breves, oblongae, oculi prominuli. Prothorax convexus, transversim quadratus, antice rotundatus angulis deflexis, infra medium parum arcuatus, ante angulos posticos leviter sinuatus, angulis rectis breviter carinatis, basi in medio prolongata, impressione transversali postica basi proxima, punctulata, foveolis basalibus distinctis; impressione transversali antica haud conspicua. — Elytra breviter ovata, postice angustata,

basi angulata; stria 8.ª integra; striis dorsalibus 5, suturali integra, 2.ª apice, 3.ª, 4.ª et 5.ª basi apiceque abbreviatis, striola recurva brevi, profunda, apice haud hamata.

Long. 2 $^2/_3$ — El. 1 $^2/_3$ — Lat. 1 $^1/_2$ mill.

Macassar (Beccari) Mus. Civ. de Gênes.

T. umbrosus, Motsch. Bull. Mosc. 1851, 507, n. 142. Et. ent. IX, 32.

Très voisin du *T. nanus* Gyll.

Ind. or.

T. plagiatus, n. sp.

Niger, subcyaneo-micans, palpis, antennarum art.^{is} 3 primis, tibiis, elytrorum margine maculisque in singulo 3 testaceis, quarum 1.ª subhumerali oblonga, 2.ª transversa ante-apicali marginem versus, 3.ª rotundata in apice ipso. — Sulci frontales elongati, postice pone oculos divergentes. Prothorax latus, transversim quadratus, lateribus rotundatus, basi prolongata, versus angulos obtusos ascendente, impressione transversa postica brevi, basi approximata. Elytra ovata, subtruncata, in medio rotundata: stria 8.ª apice tantum conspicua, striis dorsalibus 3, 1.ª tantum integra, striola apicali recurva in medio sita, longa, apice hamata.

Long. 2 $^3/_4$ — El. 1 $^2/_3$ — Lat. 1 $^1/_4$ mill.

Macassar (Beccari) Mus. Civ. de Gênes.

T. pictipennis, n. sp.

Long. 2 $^1/_2$ — El. 1 $^1/_2$ — Lat. 1 mill.

T. plagiato, subtimilis. Differt statura paulo minore, prothorace minus transverso, basim versus angustato.

Forsan mera varietas.

Patria eadem (Beccari) Mus. Civ. de Gênes.

T. impressipennis, Motsch. Et. ent. 1859, 39.

Testaceus, prothorax antice profunde emarginatus, lateribus anticis maxime rotundatis dein angustatis, angulis posticis rectis; striis dorsalibus 2. (1 $^3/_4$).

Ceylan (Colombo).

T. flaviculus, Motsch. Et. ent. 1859, 39.

Testaceus, prothorace angulis posticis acutis, striis dorsalibus 3. (1 1/2).

Ceylan (Colombo).

T. suturalis, Motsch. Bull. Mosc. 1851, p. 508, 146.

Testaceus, laevis, elytrorum sutura in medio dilatata fusca, stria dorsali 1.ª profunda: prothorace impressione transversa postica in medio interrupta (2 1/2).

Ind. or.

T. tropicus, Nietn., l. c., p. 421, 71.

Ceylan.

T. cinctus, n. sp.

Testaceus, vertice, antennarum art.is 2-6 obscuro-notatis, elytrorum fascia media lata nigra. — Antennae graciles, articulis elongatis. Labrum subemarginatum, oculi maxime prominuli; sulci frontales profundi, postice divergentes, oculorum basim amplectentes. Prothorax latus, brevis, transversim cordatus, antice rotundatus, infra medium angustatus atque sinuatus, angulis posticis acute rectis, margine antico emarginato, angulis rotundis; basi in medio prolongata, versus angulos obliqua, sulco transversali basali profundo, punctato. Elytra oblonga, basi truncata, in medio rotundata, parum convexa, stria 8.ª apice tantum conspicua, striis dorsalibus vix 3, striola apicali recurva in medio sita, arcuata.

Long. 2 1/2 — El. 1 1/2 — Lat. 1 mill.

NB. Dans tous les *Tachys*, le 3.e intervalle porte trois points ocellés. Dans cette espèce le point supérieur est situé au fond d'une dépression de la 3.e strie.

Ce joli insecte a un peu l'aspect d'un *Trechus;* mais il a bien les caractères des *Tachys.*

Amboine (Beccari), 1 seul ind. — Mus. Civ. de Gênes.

T. cruciger, n. sp.

Niger, palpis, antennis, pedibus, elytrorum margine maculisque in singulo 3, quarum 1.ª majore subhumerali oblonga, 2.ª subrotundata ante-apicali versus marginem, 3.ª minuta in apice ipso, testaceo-albidis. Antennae graciles, articulis ultimis infuscatis. Oculi prominuli; sulci frontales profundi, posterius versus oculorum basim divergentes. Prothorax breviter subcordatus, antice emarginatus, ad angulos leviter rotundatos arcuatus, post medium angustatus, ante angulos erectos obtusos sinuatus, basi utrinque obliqua; impressione transversali postica brevi, in medio angulata. Elytra oblonga, fere parallela, basi truncata in medio rotundata, haud convexa, sutura basi depressa; stria 8.ª ante apicem tantum conspicua, striis dorsalibus 2 parum profundis, 3.ª leviore apice distincta sub puncto ultimo piligero inter suturalem atque striolam recurvam.

Long. 2 $^1/_2$ — El. 2 — Lat. 1 mill.

Macassar (Beccari). — Mus. Civ. de Gênes.

Si l'on considère le fond des élytres comme étant testacé, leur partie noire se présente sous la forme d'une croix dont la branche supérieure occupe les trois premiers intervalles et qui, un peu au dessous du milieu, se dilate jusqu'au bord externe.

T. ephippiatus, n. sp.

Testaceus, antennis apice, elytris plaga suturali in medio latiore ad marginem usque extensa, infuscatis, maculis 2 ante-apicalibus rotundis pallidioribus.

Long. 2 $^1/_2$ — El. 1 $^1/_2$ — Lat. 1 mill.

La tête et le corselet sont à peu près comme dans l'espèce précédente; cependant les yeux sont moins saillans, le corselet est un peu plus large en avant, plus rétréci en arrière, non sinué au dessus des angles de la base qui sont moins marqués et nullement saillans. Les élytres sont plus arrondies sur les côtés, moins tronquées à la base où les épaules sont beaucoup moins relevées: les taches noires qui se croisent

au milieu sont ici légèrement brunâtres et moins distinctes vers la base; la sculpture des élytres est la même, sauf que l'extrémité du 3.e intervalle ne reparait pas au dessous du point apical.

Macassar (Beccari), un seul individu. — Mus. Civ. de Gênes.

Cillenum Albertisi, n. sp.

Nigro-aeneo-nitidum, aciculatum, prothorace capiteque aeneo-subcupreis; palpis (maxillarium art. penultimo piceo), antennarum articulis 3 primis, mandibulis basi, tibiis tarsisque testaceis; lunula marginali testaceo-rufa ante mediam elytrorum partem. Mandibulae longae, angustae, apice tantum curvatae. Labrum angustissimum subemarginatum. Caput tumidulum, haud punctatum, utrinque sulcatum, sulcis latis parallelis; oculi prominuli. Antennae prothorace longiores, ab art. 3.0 crassiores. — Prothorax cordatus, basi sub angulos emarginata, his acutis prominulis; impressione transversali postica profunda. — Elytra elongato-oblonga, lateribus parum arcuata, ante apicem sinuata, humeris elevatis obtusis; striata, striis apice et extus paulo profundioribus; interstitiis subconvexis, inaequalibus, 3.0 bipunctato, striola subscutellari longa suturae parallela.

Long. 4 — El. 2 $^1/_2$ — Lat. 1 $^1/_3$ mill.

Il diffère du *C. laterale* par sa coloration, sa taille un peu plus petite et plus étroite, son corselet moins arrondi sur les côtés, plus rétréci vers la base, ses élytres plus allongées mais moins parallèles, ses épaules plus relevées etc.

Nouvelle Guinée (Sorong), Mars 1872. (Beccari et D'Albertis). 1 ind. — Mus. Civ. de Gênes.

Bruxelles, Octobre 1875.